

คอดัมນ์แน่นำทำกินทั่วถิ่น ไทย

การเลี้ยงไก่วง



พนม เกิดแสง

เชื่อว่าเราคงได้เจอกับคำตามที่ว่า ไก่เกิดก่อนไข่หรือไข่เกิดก่อนไก่ ลองดูสิว่าเราจะพบคำตอบหรือไม่

การเลี้ยงไก่วงในประเทศไทยเริ่มได้ความนิยมและเลี้ยงกันมากในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ เกษตรกรหลายพื้นที่เริ่มหันมาเลี้ยงไก่วง ด้วยมีตลาดรองรับเพิ่มขึ้น อีกทั้งมีชุมชนชาวคริสต์อาศัยค่อนข้างมากในทางภาคเหนือ การ เนื้อไก่วงมีแคลเซียมสูง มีแคลอรี่ต่ำกว่าไก่ธรรมชาติ ทั่วไปและมีไขมันอิ่มตัวน้อยกว่าเนื้อสัตว์อื่น ๆ นอกจากนี้ยังมีโปรดีนที่สูงกว่าเนื้อไก่ เนื้อวัวหรือเนื้อหมูและมีกรดอะมิโน ที่จำเป็นต่อการสร้างโปรดีนที่สมบูรณ์ของร่างกาย

ไก่วง

(Turkey) ชื่อวิทยาศาสตร์ *Meleagris gallopavo* *M. gallopavo* พบในอเมริกาเหนือ และ *M. ocellata* พบในอเมริกากลาง ไก่วงมี 2 ชนิด คือ ขนสีขาวล้วน และขนสีบรอนซ์ เปเลือกไว้เมื่อสีขาวนวลและมีจุดกระสีน้ำตาล สมาคมสัตว์ปีกของสหรัฐ (Aoultry Association) ได้กำหนดลักษณะมาตรฐานของพันธุ์ไก่วง ไว้ 7 ชนิด (Varietics) ได้แก่ บรอนซ์ (Bronze) ไวท์ฮอลแลนด์ (White Holland) บอร์บอนเรด (Bourbon Red) นาราแกนเซท (Naragansett) ดำ (Black) สาเลท (Slate) และ เบลท์สวิลล์ สมอลล์ไวท์ (Beltsville Small White)



ในส่วนของหน่วยงานราชการ โดยเฉพาะศูนย์วิจัยและบำรุงสัตว์ทันควร จ.แคนาดา และสถาบันวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์เลย กรมปศุสัตว์ มีการนำเข้าพ่อแม่พันธุ์และจัดการเลี้ยงไก่วง 2 สายพันธุ์เพื่อการศึกษาวิจัย ได้แก่พันธุ์ อเมริกันบรอนซ์ (American Beonze) และเบลท์สวิลล์สมอลล์ไวท์ (Beltsville Small White) โดยแยกเลี้ยงแต่ละสายพันธุ์เพื่อควบคุมไม่ให้ผสมข้ามสายพันธุ์

สำหรับผู้เลี้ยงในประเทศไทยพันธุ์ไก่่งวงที่นิยมเลี้ยงได้แก่ อเมริกันบรอนซ์ (American Beonze) เบลท์สวิลล์ สมอล์ไวท์ (Beltsville Small White)



คุณนายจพร ผู้เขียนและคุณธีระประชัญ ที่ฟาร์มไก่่งวงเบลท์สวิลล์

นอกจากนี้ยังมีไก่่งวงลูกผสม (Hybrids) ซึ่งได้จากการผสมข้ามสายพันธุ์ ทำให้ได้รูปร่างสีสันที่แตกต่างไปจากสายพันธุ์หลักอีกมากมาย เช่นที่ฟาร์มไก่่งวงเบลท์สวิลล์ ที่จังหวัดหนองบัวลำภู นับได้ว่าเป็นแหล่งที่มีไก่่งวงลูกผสมมากที่สุดถึงกว่า 10 สายพันธุ์

พันธุ์เบลท์สวิลล์ สมอล์ไวท์

(Beltsville Small White) มีขนาดลำดัวปานกลาง และขนาดเล็ก ขนสีขาว หนังสีขาว แข็งและนิ่วเท้าสีชมพูซีด ตาสีน้ำตาล จอยปากสีเทา ปริมาณการไก่ ให้ผลผลิตไก่ประมาณ 80 ฟอง/ตัว/ปี น้ำหนักมาตรฐาน ไก่่งวง เพศผู้ น้ำหนักประมาณ 7.7 กิโลกรัม ไก่่งวง เพศเมีย น้ำหนักประมาณ 5 กิโลกรัม เพศผู้หนุ่ม น้ำหนักประมาณ 6.7 กิโลกรัม เพศเมียสาว น้ำหนักประมาณ 4 กิโลกรัม



ไก่่งวง พันธุ์เบลท์สวิลล์ สมอล์ไวท์หรือ ขาวเมืองเลย และคุณ เจนรงค์ คำมุงคุณที่สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์เลข

คุณเจนรองค์ คำมุงคุณ นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ ได้ให้เชิงเด็ก ไก่่งวง ตัวผู้ จะมีขนคล้ายผูมสีดำ แข็ง ติดอยู่ตรงบริเวณหน้าอก และตัวเมียที่มีโอกาสพบบนสีดำ ผลผลิตไก่ 80 ฟอง/ปี น้ำหนักเมื่ออายุ 5 เดือน เพศผู้ประมาณ 6.7 กิโลกรัม เพศเมียประมาณ 4 กิโลกรัม น้ำหนักเมื่อโടเด้มที่ เพศผู้ ประมาณ 7.7 กิโลกรัม เพศเมีย ประมาณ 5 กิโลกรัม ซึ่งทางสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์เลข ทำหน้าที่ผลิตพ่อแม่พันธุ์ไก่ งวง พันธุ์เบลท์สวิลล์ สมอล์ไวท์ (Beltsville Small White) ตั้งแต่ลูกไก่ จนถึงไก่อายุตั้งแต่ 1-6 เดือนพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ ทั้งหมดประมาณเกือบ 1000 ตัวมีการคุ้มครองอย่างดีในทุกๆขั้นตอน ตั้งแต่ที่เก็บไข่ในตู้เรือนูนาก ไปจนถึงการจัดการและดูแลของบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ โดยที่ทางสถานีได้ตั้งชื่อใหม่ว่า ไก่่งวงขาวเมืองเลย

พันธุ์อเมริกันบอร์นซ์

(American Bornze) จัดเป็นไก่ງวงพันธุ์หนัก ขนสีบ

รองซ์ปันน้ำตาลคำ ปลายขนสีขาวเล็กน้อย แข็งและนิ่วเท้าสีเทาอ่อนปนชมพูซีด ตาสีน้ำตาล จอยปากสีเทาอ่อน ข้อสังเกต ตัวผู้ จะมีขนคล้ายผมสีดำ แข็ง ติดอยู่ตรงบริเวณหน้าอก เป็นตัวบ่งชี้ถักยณะทางเพศของไก่ງวงตัวผู้ที่อายุก่อน 12 สัปดาห์ ผลผลิตไก่ 70 กก./ปี น้ำหนักเมื่ออายุ 5 เดือน เพศผู้ประมาณ 11 กิโลกรัม เพศเมียประมาณ 7 กิโลกรัม น้ำหนักเมื่อโตเต็มที่ เพศผู้ประมาณ 15 กิโลกรัม เพศเมียประมาณ 9 กิโลกรัม



ไก่ງวงพันธุ์อเมริกันบอร์นซ์ ที่สูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทั่วทั้งกว่า

ไก่ງวงคาดว่าจะเป็นหนึ่งในสัตว์เศรษฐกิจ ที่สามารถสร้างรายได้ให้กับผู้เพาะเลี้ยง เมื่อมีน้ำหนักเมื่ออายุ 5 เดือน แนวทางและวิธีการเลี้ยง แบ่งออกได้เป็น 2 แนวทาง คือ เลี้ยงเพื่อการจำหน่ายลูกไก่ງวง และ เลี้ยงเพื่อจำหน่ายเนื้อไก่ງวง ไก่ງวงจะเริ่มออกไข่ เมื่อไก่อายุ 6 เดือน น้ำหนักประมาณ 5 - 6 กก.

ลักษณะไข่ที่ดี

จะต้องมีรูปร่างขนาดน้ำหนักและเปลือกตรงตามสายพันธุ์ โดยที่เปลือกไข่ต้องแข็งไม่อ่อนหรือกระดอง เครื่องดื่มหรือยาสูบ ฟรีแม่น และทึมนักวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเซฟฟิลด์ และวาร์วิคพบว่า โปรตีนชื่อ ovocledidin-17 เป็นคุณเจลสำคัญที่ทำให้ไข่มีเปลือกแข็งอย่างที่เห็น และด้วยเหตุผลง่ายๆ ก็คือ โปรตีนที่จำเป็นดังกล่าวจะสามารถผลิตได้จากในตัวไก่เท่านั้น ดังนั้นไข่จึงไม่มีวันที่จะเกิดขึ้นมา ก่อนที่จะมีไก่ได้ โปรตีน OC-17 ทำหน้าที่เป็นตัวกระตุ้น และเริ่มต้นกระบวนการเปลี่ยนสภาพของแคลเซียมคาร์บอนเนตจากในตัวไก่ให้อยู่ในรูปของเปลือกแข็งที่ใช้ห่อหุ้มไข่แดงและไข่ขาว ซึ่งหากไม่มีไข่ตันตอน หรือกระบวนการนี้ก็จะไม่อาจเกิดขึ้นได้ และสามารถนำไปใช้ในการหาอายุได้อีกด้วย



ในการฟักไข่น้ำสามารถที่จะใช้ไฟแม่ไก่ฟักเองตามธรรมชาติ หรือจะใช้วิธีนำเข้าสู่ฟักไปได้
แต่ในที่นี้จะแนะนำให้ใช้ตู้ฟักไข่จะสะดวกต่อการผลิตลูกไก่เป็นรุ่นๆ

คุณภูริ วีระสมิทธิ์ นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทั่วทั้งกว่าได้ให้ข้อมูลน้ำการฟักไข่ไก่ງวงว่า เมื่อเก็บไข่มาแล้วให้ทำความสะอาดเปลือกไข่โดยใช้น้ำเปล่าผสมน้ำยาฆ่าเชื้อชุมผ้าพอหมาดๆ เช็ดเปลือกไข่โดยรอบให้ทั่ว



ผู้เขียนคุณภรี วีระสมิทธิ์ และทีมงาน

จากนั้นเช็คคุณภาพของไข่่าว่าบิดเบี้ยว หรือถ้าเปลือกแตกร้าวักก็ตัดออก ขนาดของไข่ก็ เช่นกัน ไม่ควรเล็กหรือใหญ่เกินไป น้ำหนักโดยเฉลี่ยของไข่ประมาณ 55-60 กรัมต่อฟอง ซึ่งจะให้น้ำหนักแรกเกิดของลูกไก่ 53 กรัมต่อตัว



การทำความสะอาดไข่และกำจัดไข่ที่เสียหาย



การพักไข่ในห้องความชื้นอุณหภูมิเพื่อรอเข้าตู้ฟิกที่ศูนย์วิจัยบำรุงพันธุ์สัตว์ทั่วภาคกลางนำไข่เข้าฟิกเป็นรอบสับปด้าห์ต่อครั้งทั้งนี้เพื่อให้มีอุ่น ไก่เกิดทุกตัวพากห่อเย่างต่อเนื่อง

เมื่อทำความสะอาดไข่เรียบร้อยแล้วก็นำเข้ามารอพักไว้ในห้องเย็นที่อุณหภูมิประมาณ 18-20 องศาเซลเซียสแต่ไม่ควรเก็บเกิน 10 วัน เพราะอัตราเชื้อตายจะสูงนำเข้าตู้ฟิกมักจะไม่ค่อยได้ผล



គ្មាយកីឡបែងគ្រងជាច្បាសសម្រាប់ពេករាងដូចទីនាំគឺជាការរាយបែងគ្រងនៃគ្មាយកីឡដើម្បីបញ្ជូនរលាចកីឡសម្រាប់បានពិនិត្យបន្ថែមជាពេករាងទីនាំ។



ក្រវត្ថុកីឡក្នុងកម្មវិធីតាមអាជីវកម្មកីឡសម្រាប់បានពិនិត្យបន្ថែមជាពេករាងទីនាំ។ តាមការស្នើសុំតាមតម្លៃកម្មវិធីតាមអាជីវកម្មកីឡដែលត្រូវបានបន្ទាត់ស្រួលតាមការស្នើសុំតាមអាជីវកម្មកីឡសម្រាប់បានពិនិត្យបន្ថែមជាពេករាងទីនាំ។

ការបានពិនិត្យបន្ថែមជាពេករាងទីនាំ ត្រូវបានបន្ទាត់ស្រួលតាមការស្នើសុំតាមអាជីវកម្មកីឡដែលត្រូវបានបន្ទាត់ស្រួលតាមការស្នើសុំតាមអាជីវកម្មកីឡសម្រាប់បានពិនិត្យបន្ថែមជាពេករាងទីនាំ។



កុណភុទ វិរាសិនិធមូនីយុជ្ជិយនិទ្ទេ ត្រូវបានបន្ទាត់ស្រួលតាមការស្នើសុំតាមអាជីវកម្មកីឡដែលត្រូវបានបន្ទាត់ស្រួលតាមការស្នើសុំតាមអាជីវកម្មកីឡសម្រាប់បានពិនិត្យបន្ថែមជាពេករាងទីនាំ។

កុណភុទ វិរាសិនិធមូនីយុជ្ជិយនិទ្ទេ ត្រូវបានបន្ទាត់ស្រួលតាមការស្នើសុំតាមអាជីវកម្មកីឡដែលត្រូវបានបន្ទាត់ស្រួលតាមការស្នើសុំតាមអាជីវកម្មកីឡសម្រាប់បានពិនិត្យបន្ថែមជាពេករាងទីនាំ។

ការបែងប្រែកដែលត្រូវបានបន្ទាត់ស្រួលតាមអាជីវកម្មកីឡដែលត្រូវបានបន្ទាត់ស្រួលតាមអាជីវកម្មកីឡសម្រាប់បានពិនិត្យបន្ថែមជាពេករាងទីនាំ។



ការបែងប្រែកដែលត្រូវបានបន្ទាត់ស្រួលតាមអាជីវកម្មកីឡដែលត្រូវបានបន្ទាត់ស្រួលតាមអាជីវកម្មកីឡសម្រាប់បានពិនិត្យបន្ថែមជាពេករាងទីនាំ។



ให้อาหารสำเร็จรูปเป็นอาหารลูกไก่นึ่ง ซึ่งมีโปรตีน เปอร์เซ็นต์หรือมากกว่า และน้ำ 21 สะอาดเวลากลางคืนควรยกอ่างน้ำออกไม่ให้น้ำและอาหารให้แต่ความอบอุ่นเพียงอย่างเดียวเพื่อป้องกันความชื้นลูกไก่จะได้ไปเป็นโรคปอดบวมและความทำความสะอาดพื้นและกรงทุกวันป้องกันการเกิดโรค และควรปิดฝากรงให้สนิทป้องกันอันตรายจากสัตว์อื่น



อุปกรณ์ ให้น้ำและอาหาร

ต้องจัดทำที่เรวนไว และให้น้ำมาทำความสะอาดด้านตาข่ายให้แห้งอย่างสม่ำเสมอ และต้องมีลานสำหรับให้ไก่ลงวิง เดินออกกำลังกายด้วย ดังนั้นการสร้างโรงเรือน จึงอาจเป็นลักษณะล้อมด้วยตาข่ายหรือรั้วไม้กว้างๆ และไม่โรงเรือนที่มีหลังคาอยู่ บริเวณกลางคอก หรือด้านข้างก็ได้ สำหรับให้ไก่ลงหлевและหอบฟัน สิ่งสำคัญจัดเตรียมทำคอนให้ไก่ลง เพราะนิสัยของไก่จะลงขอบนอนที่สูงเนื่องจากไก่จะมีพันธุกรรมของไก่ป่าจึงมีร่างกายที่แข็งแรงและทนโรค ลักษณะของคอนนอนจะต้องเป็นไม้กลมไม่มีเหลี่ยมเช่น ไม้ไผ่ โดยในบริเวณรอบคอนนอนอาจวางกล่องไม้หรือวัสดุสำหรับให้ไก่ลงวางไข่ เวลากลางคืนควรหาผ้าหรือตาข่ายคลุมกันยุง เมื่ออายุครบ 15 วันนำไปใส่ในกรงปล่อยเลี้ยงตามธรรมชาติ



เมื่ออายุ 30 วัน ให้อาหาร ร่วม หัวอาหาร อัตรา +1 : 1

ถ้าไก่ไม่เข็งแรงใช้หัวอาหารเสริมด้วยฟ้าทะลายโจร ตะไคร้ก่อน กระเพรา ไทรพา สับผัสมในอาหารให้กิน- อาหารที่ให้ จะให้รับผิดชอบน้ำพอกเปียกชุ่มๆ



เมื่ออายุครบ 15 วันนำไปใส่ในกรงปล่อยเลี้ยงตามธรรมชาติ เมื่ออายุ 30 วัน ให้อาหาร ร่วม + หัวอาหาร อัตรา 1 : 1

การให้วัคซีนป้องกันโรค

เมื่ออายุไก่ 21-30 วัน ให้วัคซีนป้องกันโรค โดยการแทงปีกทั้ง 2 ข้าง และให้วัคซีนป้องกันโรค อหิวาต์ ให้มื่ออายุ 30 วัน โดยฉีดเข้ากล้ามเนื้อหน้าอก ทั้งนี้ควรให้วัคซีนนิวคลาสเซิลหลอดลมอักเสบ+และฟีดาຍ กระตุ้นช่วง 3-4 เดือน



เมื่ออายุ 7-14 วัน ให้วัคซีน นิวคลาสเซิลหลอดลมอักเสบ+ โดยการ หยดตาทั้ง 2 ข้าง



อาหารที่ใช้เลี้ยงไก่งวง

ช่วง 0-1 เดือนให้ อาหารที่มีหัวอาหาร 22% "ไม่ควรให้ปลายข้าวและข้าวเปลือก

เพราะจะทำให้ไก่ลงไข่ขาวตามและเข้าใจว่าเป็นอหิวาต์ตายช่วง 2-5 เดือนให้ อาหารที่มีหัวอาหาร 14% ช่วง 5 เดือน ให้ อาหารร้าอ่อนรำ+ หมาย เกษตรกรอาจจะผสมเอง อาจจะนำพืชสมุนไพรต่างๆที่ปลูกในสวน เช่น หญ้าสด ผักบุ้ง หมายกล้วย หัวมันเหنجือกปลาหม้อ ฟ้าทลาย โจร ขมิ้นชัน ไพร เป็นส่วนผสมหลัก และนำไปผสมกับมันสำปะหลังปืน 1 ส่วน รำ 4 ส่วน และ ปลาป่นอีก 1 ส่วน มากลูกเคล้าให้เข้ากัน เพื่อ ใช้เป็นอาหารขันสำหรับเลี้ยงไก่งวง เพื่อบำรุงและสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ไก่งวง โดยให้วันละ 1 ครั้ง ในช่วงเช้าและให้เที่ยหัญชา เศษผัก เป็น อาหารเสริมในช่วงบ่าย



สมุนไพรต่างๆที่ปลูกในสวน เช่น หญ้าสด ผักบุ้ง หมายกล้วย หัวมันเหنجือกปลาหม้อ ฟ้าทลาย โจร ขมิ้นชัน ไพร เป็นส่วนผสมหลัก และนำไปผสมกับมันสำปะหลังปืน 1 ส่วน รำ 4 ส่วน และ ปลาป่นอีก 1 ส่วน มากลูกเคล้าให้เข้ากัน



ຄຸນກູງວີ ວິໄຮສົມທີ່ ໄດ້ໄທ້ແນວທາງການສ່ງເສັນແລະການຮ່ວມກຸ່ມຜູ້ເລີ່ມໄກງວຈຽນ ກ່າວງວ່າຜູ້ທີ່ສຳໃຈຈະເລີ່ມໄກງວຈຽນ ຂະໜາຂໍ້ມູນໄຫ້ລະເອີດກ່ອນໂດຍ ອາຈະກຶກຍາຈຸກຜູ້ຮູ້ເຊັ່ນໜ່າຍງານປຸສັດຕົວທີ່ໄກລ້ນ້ຳ ທີ່ຜູ້ທີ່ເຄຍເລີ່ມມາກ່ອນ ແລະກວາມຕັ້ງໃຈທີ່ຈະເລີ່ມເພື່ອອະໄໄເຊັ່ນເລີ່ມເພື່ອກວາມສາຍາງາມ ເລີ່ມເພື່ອຈຳໜ່າຍລຸກໄກ່ທີ່ເລີ່ມເພື່ອເອານື້ອທີ່ນີ້ຈະໄດ້ວາງແຜນການເລີ່ມໄດ້ອ່າງລຸກຕ້ອງ ໃຫ້ທີ່ນີ້ຈະແນະນຳກຸ່ມຜູ້ເລີ່ມໄກງວຈຽນ ກ່າວງຈຽນ ຈ.ນຄຣາຊສິມາຊື່ໄດ້ຮ່ວມຕັກນາມໄດ້ຮະບະໜຶ່ງແລ້ວແລະເຮັ່ນມີກວາມເຂັ້ມແໜ້ງສາມາດຄົດເປັນລຸກໄກ່ທີ່ເລີ່ມເພື່ອທີ່ຮ່ວມຮັບກວາມຕັ້ງການບໍລິການໃນພື້ນທີ່ໄດ້ຮັບດັບໜຶ່ງອ່າຍຸ່ງຕ່ອນເນື່ອງ



ราคาขายลูกໄກງວ

ທີ່ສູນຢັ້ງຢັ້ງແລະນໍາຮູ້ພັນຮູ້ສັດຕົວທັນກວາງແລະສານີວິຈີຍທດສອນພັນຮູ້ສັດຕົວເລຂຮາລຸກໄກ່ແຮກເກີດ 35-45 ບາທໂດຍປະມາມ ທີ່ນີ້ຕ້ອງຕິດຕ່ອງສ່ົງຈອງລ່ວງໜ້າ ສໍາຫັນພາຮົມທ່າໄປຄາງາຍໂດຍຄຸນເລີ່ມຍຸ່ງຮ່ວ່າງ 60-100 ບາທ

ສໍາຫັນໄກ່ຮູ້ນີ້ 3-4 ເດືອນຄາງາຍໂດຍຄຸນເລີ່ມ 300-400 ບາທຕ່ອດ້າວ ແລະທາກເປັນໄກ່ເນື້ອຮ່າງຄາ 150 ບາທຕ່ອດ້ອກໂລກຮັມໂດຍປະມາມແລະຈະແພງນາກໃນຊ່ວງປາຍປີເນື່ອງຈາກມີກວາມຕ້ອງການບໍລິການເນື້ອໃນຊ່ວງເທສກາລຄຣິສມາສ ປີໃໝ່ ທີ່ວັນຂອນຄຸນພະເຈົ້າ ຈະມີປິຣິມານກວາມຕ້ອງການສູງນາກເປັນພຶສຍ ອາຈກລ່າວໄດ້ວ່າໃນອນາຄຕົ້ນໄກລັ້ນໄກງວສານາຄເປັນອົກທາງເລືອກໜຶ່ງທີ່ມີອນາຄຕົ້ນການທໍາຮ່າຍໄດ້ໄກ່ແກ່ກ່ອນກວ້ວທີ່ເຊັ່ນໃຫ້ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກແກ່ສາຫະປະໃນວັກວ້າງອ່າຍແນ່ນອນ



ຄົງຕອນນີ້ພົບຄຳຕອບທີ່ເຊັ່ນວ່າ ໄກເກີດກ່ອນໄຂ່ທີ່ໄກ່ເກີດກ່ອນໄຂ່ທີ່ໄກ່ເກີດກ່ອນໄກ່

ข้อมูลเพิ่มเติม

ครุณี โสภานและคณะ คู่มือการปฏิบัติงานเครื่องข่ายสัตว์ปีก ; โครงการพัฒนาระบบมาตรฐานการผลิตสัตว์ปีก . สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์
กรมปศุสัตว์.2556

Dr. Colin Freeman, British scientists crack riddle and say chicken came before the egg ; Sheffield University's
Department of Engineering Materials., FROM CORRESPONDENTS IN LONDON ;AAPJULY 15, 2010 9:34AM

ท่านที่สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ

ศูนย์วิจัยบำรุงพันธุ์สัตว์ทั่วภาคใต้.ทั่วภาคใต้ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18260 โทร. 0-3635-7362 หรือที่คุณ พิชิต ชูเสน โทร 089-539-5396
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์เลย เลขที่ 302 หมู่ที่ 11 ตำบลครีสุกรรม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 42130 โทร.042-841517 หรือที่คุณ เจนรังค์ คำ^{มุนคุณ} 042-801-068 หรือ 081-547-2260

ฟาร์มไก่ງวงเบญจพรศิริ 119 ม.5 ต.โพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 39000. โทร.080-4608969 086-8572747

และชุมชนผู้เลี้ยงไก่ງวงกรนรี จ.นครราชสีมา

คุณจำเนียร สวนงาม(ป้าหน่อน) 081-266231 คุณเบรมปวีร์ สิงหนเนตรวัฒน์ 081-7308758 คุณปัจพล คำรงค์ 084-4766459

หากท่านที่สนใจข้อมูลในรูปแบบ วีซีดี เรื่อง การเลี้ยงไก่ງวง สามารถติดต่อสั่งซื้อได้ที่ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลาดยาว ชตุจักร กทม.10900 โทร 02-5792294 และ 02-9428460 ต่อ500 หรือ

<http://www.eto.ku.ac.th/media/index.html>

ฉบับหน้าจะนำท่านไปดู การเลี้ยงปลากระเพงในบ่อคิน ที่จ.สมุทรปราการครับ

